3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 02

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence** de l'enfant ainsi qu'un **téléphone portable.** ***Ne pas quitter l'enfant.***

La réaction a lieu dans les minutes suivant l'exposition à un aliment/une piqure d'insecte

Précisions :

Evaluer immédiatement la gravité de la réaction :

La réaction est GRAVE

Si 1 seul des signes parmi les suivants

Il respire mal et sa voix change
Il respire mal et il siffle ou il tousse
Il a très mal au ventre, il vomit de façon itérative
Il devient rapidement rouge sur tout le corps et ses mains, ses pieds, son cuir chevelu le démangent
Il se sent mal ou bizarre
Il fait un malaise

La réaction est d'autant plus grave que plusieurs de ces signes sont associés

⇩

LES BONS REFLEXES

1 – Allonger l'enfant ou le laisser ½ assis en cas de gêne pour respirer
2 – Injecter L'ADRENALINE dans la face externe de la cuisse. *Spécialité* :
3 – Puis appeler le SAMU (15 ou 112)
4 – Si gêne respiratoire : faire inhaler bouffées de avec la chambre d'inhalation (5 respirations après chaque bouffée) – à répéter selon la gêne après 10 à 15 mins

En attendant les secours, une 2ème injection d'adrénaline peut être faite si les symptômes persistent après 5 à 10 minutes ou plus

La réaction est MODEREE

Sa bouche pique, ses lèvres gonflent
Ses yeux piquent, son nez coule
Des plaques rouges démangent de façon localisée
Il a un peu mal au ventre et/ou il a envie de vomir
Autre :

Mais il parle bien et il respire bien

⇩

LES BONS REFLEXES

1 – Traitement anti-histaminique par voie orale :

2 – Surveiller l'enfant jusqu'à la disparition des symptômes
3 – Prévenir les parents et leur conseiller de consulter un médecin
4 – Autre :

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION
OU SI APPARITION D'UN NOUVEAU SIGNE
EVALUER DE NOUVEAU LA GRAVITE DE LA REACTION
POUR NE PAS RETARDER L'INJECTION D'ADRENALINE

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : *Courrier joint* : ☐OUI ☐ NON

Cachet du médecin : Date : Signature du médecin :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT

Modalités de l'injection de l'adrénaline selon la présentation du produit

☐ ANAPEN

Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille.

Retirer le bouchon protecteur.

Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse.

Appuyer sur le bouton rouge et maintenir appuyé 10 sec. Puis masser la zone d'injection.

☐ EMERADE

www.emerade-bausch.fr

Enlever le bouchon blanc.

Placer le stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit



Appuyer fermement et maintenir appuyé pendant 5 secondes

Puis masser la zone d'injection

☐ EPIPEN



Enlever
Le capuchon bleu

Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit

Enfoncer fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes

Puis masser la zone d'injection

☐ JEXT



Enlever
le bouchon jaune.

Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse à angle droit

Appuyer fermement sur la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes.

Puis masser la zone d'injection.

Nom/ Prénom :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT